

Sécuriser ses stocks de fourrages

Possibilité d'achat de pommes de terre entières

Suite au coronavirus et aux mesures de fermeture des restaurants, l'usine MAC Cain, à Matougues, dispose actuellement de stocks importants de pommes de terre, déterrées, non lavées, initialement destinées à être consommées sous forme de frites.

Il est possible de se déplacer pour aller en chercher ou d'être livré par camion de 30 T environ.

Prix départ : 15 €/T HT

Si vous êtes intéressés, contact : Jean-Christophe VOGNY, 06 07 83 44 96

➤ Des pluies très attendues

Les températures moyennes des derniers mois ont été au-delà des normales : Mars +1°, Avril environ + 2,5°, avec un déficit hydrique très important depuis mi-mars.

Les effets sont là, avec de forts contrastes selon les exploitations, les sols, les pratiques,...

- Faiblesse des rendements sur les prairies permanentes, en particulier lorsque la fertilisation a été réalisée vers mi-mars ou que les parcelles ont été inondées, or la 1^{ère} coupe représente habituellement environ 2/3 du rendement annuel
- Difficulté d'implantation des maïs et/ou levées difficiles
- Potentiel de rendement des blés/escourgeon en paille et en grain amoindri

Les pluies annoncées les prochains jours seront donc largement bienvenues.

» Des mesures de précaution

L'insécurité climatique des dernières années et la faiblesse des stocks actuels, souvent très justes pour faire la soudure, incitent à la prudence. Voici quelques mesures de précaution :

▶ **Essayer d'économiser la paille :**

- limiter les quantités de paille en litière pour les animaux qui ont peu de risques sanitaires
- si la météo le permet, augmenter le temps de présence à l'extérieur des animaux actuellement en bâtiment

▶ **Anticiper les ventes de réforme,** limiter le nombre d'animaux quand c'est possible

▶ De manière générale, **vérifier la possibilité des ressources fourragères supplémentaires,**

- Se rapprocher des voisins céréaliers pour se garantir un approvisionnement en paille, bloquer des surfaces d'achat sur pied de maïs ou luzerne ou autres, ...
- Aliments composés, mélanges humides, produits déshydratés chez les fournisseurs d'aliment

▶ **Faucher des surfaces prévues en céréales blé, orge,** (parcelles avec forte pression de ray-grass, par exemple).

Attention, comme pour l'herbe, les stades physiologiques peuvent avoir de l'avance, le stade laiteux pâteux a de fortes chances d'être atteint vers fin mai, cesser au moins un mois avant l'usage de produits phytosanitaires. Si pas possible ou trop tard, réserver ce fourrage aux génisses.

Prévoir le semis d'une dérobée après récolte.

▶ Prévoir **des semences de dérobées fourragères** sur son exploitation, s'accorder avec un ou des voisins céréaliers pour que leurs CIPAN soient des espèces fourragères à récolter à l'automne, en accord avec la réglementation

▶ Dans les situations les plus compliquées, rationner les fourrages à l'auge

La FDSEA 51 et la Chambre d'Agriculture de la Marne viennent de faire la demande de dérogation à la fauche des jachères au vu de la situation.

L'équipe élevage reste à votre disposition pour échanger sur ces sujets et surveiller l'évolution de la situation au fil des semaines.